
COVID-19 Isolation and Quarantine Guidance for Children

This policy is effective May 25, 2022

- Quarantine for asymptomatic exposed children, regardless of where the exposure occurred, is no longer required for these settings. Children who are identified as close contacts may continue to attend programming as long as they remain asymptomatic. Those who can mask should do so until Day 10. A test on Days 2 and 5 is recommended, but not required.
- Children who test positive must isolate for at least 5 days. If they are asymptomatic or symptoms are resolving and they have been fever free for 24 hours, they may return to programming after Day 5.
- Symptomatic children should be sent home and allowed to return to their program if they test negative, or they have been fever-free for 24 hours without the use of fever-reducing medication and their symptoms are resolving, or if a medical professional makes an alternative diagnosis. A negative test is strongly recommended for return if the latter two conditions are met.

Note: At this time, the US Food and Drug Administration (FDA) has not approved or authorized any at-home rapid antigen test for use in children under 2 years of age. However, at-home rapid antigen tests may be used off-label in children under 2 years of age for purposes of post-exposure, isolation, and symptomatic testing. It is recommended that parents or guardians deciding to test children under 2 years of age administer the at-home rapid antigen test themselves

Covid-19 symptoms

- Fever (100.0 Fahrenheit or higher), chills, or shaking chills
- Difficulty breathing or shortness of breath
- New loss of taste or smell
- Muscle aches or body aches
- Cough (not due to other known causes, such as chronic cough)
- Sore throat, when in combination with other symptoms
- Nausea, vomiting, when in combination with other symptoms
- Headache, when in combination with other symptoms
- Fatigue, when in combination with other symptoms
- Nasal congestion or runny nose (not due to other known causes), when in combination with other symptoms

Orientación de aislamiento y cuarentena de COVID-19 para niños

Esta política entra en vigencia el 25 de mayo de 2022

- La cuarentena para niños expuestos asintomáticos, independientemente de dónde ocurrió la exposición, ya no es necesaria para estos entornos. Los niños identificados como contactos cercanos pueden continuar recibiendo los servicios siempre que permanezcan asintomáticos. Aquellos que puedan enmascararse deben hacerlo hasta el día 10. Se recomienda una prueba en los días 2 y 5, pero no es obligatorio.
- Los niños que dan positivo deben aislarse durante al menos 5 días. Si son asintomáticos o los síntomas se están resolviendo y no han tenido fiebre durante 24 horas, pueden volver a recibir servicios después del día 5.
- Los niños sintomáticos deben ser enviados a casa y se les debe permitir regresar a su servicios si dan negativo, o si han estado sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y sus síntomas se están resolviendo, o si un profesional médico ofrece una alternativa diagnóstica. Se recomienda encarecidamente una prueba negativa para el regreso si se cumplen las dos últimas condiciones.

Nota: En este momento, la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) no ha aprobado ni autorizado ninguna prueba rápida de antígeno en el hogar para uso en niños menores de 2 años. Sin embargo, las pruebas rápidas de antígenos en el hogar se pueden usar fuera de lo indicado en niños menores de 2 años para propósitos de post-exposición, aislamiento y pruebas sintomáticas. Se recomienda que los padres o tutores que decidan evaluar a niños menores de 2 años administren ellos mismos la prueba rápida de antígeno en el hogar.

Síntomas del COVID-19

-
- Fiebre (100.0 Fahrenheit o más), escalofríos
- Dificultad para respirar
- Nueva pérdida del gusto o del olfato
- Dolores musculares o dolores corporales
- Tos (no debida a otras causas conocidas, como tos crónica)
- Dolor de garganta, cuando se combina con otros síntomas
- Náuseas, vómitos, cuando se combinan con otros síntomas
- Dolor de cabeza, cuando se combina con otros síntomas
- Fatiga, cuando se combina con otros síntomas
- Congestión nasal o goteo nasal (no debido a otras causas conocidas), cuando se combina con otros síntomas.